

Envois extérieurs examens parasitaires et fongiques

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie : Professeur Alexandre ALANIO N° fax :0142494519

ETIQUETTE SERVICE PRESCRIPTEUR UH obligatoire	ETIQUETTE Code APH MEDECIN	ETIQUETTE PATIENT	ETIQUETTE PRELEVEUR
---	----------------------------	-------------------	------------------------

Téléphone du Prescripteur :

URGENT

DATE de prélèvement :

ETIQUETTE LABO

HEURE de prélèvement :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES OBLIGATOIRES

Contexte épidémiologique :

- Séjour à l'étranger :
- Hyperéosinophilie :
- Clinique :

A cette feuille, joindre obligatoirement la feuille Z756

Sérologies : 1 tube sec

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aspergillose | <input type="checkbox"/> Toxoplasmose IgM (ISAGA) |
| <input type="checkbox"/> Paludisme | |
| <input type="checkbox"/> Leishmaniose | <input type="checkbox"/> Toxoplasmose (Avidité Lecolier) |
| <input type="checkbox"/> Amibiase (Amibes) | |
| <input type="checkbox"/> Histoplasmosse | |
| <input type="checkbox"/> Anguillulose (Anguillules) | |
| <input type="checkbox"/> Bilharziose (Schistosomiase) | |
| <input type="checkbox"/> Filariose | |
| <input type="checkbox"/> Toxocarose (Larva migrans) | |
| <input type="checkbox"/> Distomatose (Fasciolose) | |
| <input type="checkbox"/> Trichinellose | |
| <input type="checkbox"/> Cysticercose | <input type="checkbox"/> Cysticercose* (LCR+ sérum)
<small>Si LCR envoyer en plus le sérum</small> |
| <input type="checkbox"/> Echinococcose (Hydatidose) | |
| <input type="checkbox"/> Trypanosoma cruzi (américaine) | |
| <input type="checkbox"/> Trypanosoma brucei (africaine) | |
| <input type="checkbox"/> Téniasis | |
| <input type="checkbox"/> Anisakiase | |

A cocher si hyperéosinophilie

Amibes libres

- PCR sur LCR
- PCR sur Humeur aqueuse
- PCR sur vitré
- PCR sur grattage de cornée

Babésia

- Sérologie babésiose (tube sec)
- PCR babésia (tube EDTA)

Sérologies rares ci-dessous après accord du parasitologue responsable : 29503

- Paragonimose
- Gnathostomose
- Angiostrongylose cantonensis

Remarque : pour les envois extérieurs à l'APHP, le transport est à la charge du service demandeur

***:En cas de demande de sérologie cysticercose dans LCR, un sérum doit être systématiquement prélevé**

Biologie moléculaire (PCR): 1 tube EDTA

- PCR trypanosoma cruzi (tube EDTA)
- PCR trypanosoma brucei (tube EDTA)